

## *Клещевой энцефалит*

Весной и летом в лесах Кузбасса обитают таежные клещи, способные передавать вирус – возбудитель тяжелого инфекционного заболевания центральной нервной системы – клещевой энцефалит.

Обитают клещи главным образом в лесах, на тропах, обочинах дорог, там, где они чаще всего могут встретить животных, кровью которых они питаются. Клещи могут быть в рощах, парках, приусадебных участках, мичуринских садах, куда они заносятся птицами, грызунами, домашними животными.

Первые признаки заболевания могут появиться уже на второй день после присасывания клеща. Чаще происходит через 7 – 15 дней. Заболевание начинается с повышения температуры и озноба, чувства слабости, головной боли, тошноты, боли в мышцах.

Тяжесть заболевания в каждом конкретном случае зависит, от состояния здоровья человека перед заболеванием, а также от количества попавшего в организм вируса и, наконец, от своевременного обращения за медицинской помощью и



получения экстренной профилактики (введение гамма – глобулина).

Прежде всего, нужно не допустить присасывания клеща. Обнаруженных присосавшихся клещей нужно сразу удалить. Клеща снятого с тела нужно сжечь, а ни в коем случае не давить, так как через поврежденную кожу (порезы, трещины) возбудитель может попасть в организм.

Человек может заразиться не только через укус, но и от употребления сырого молока от зараженных животных. Исходя из этого, молоко нужно кипятить.

***Соблюдение мер защиты от укусов клещей предупредит возникновение заболевания клещевым энцефалитом.***

